

تعليمات الاستخدام:
معلومات للمستخدم



برونشيبيريت® تي بي أقراص مغلفة

المواد الفعالة:

خلاصة جافة من جذور زهرة الربيع خلاصة جافة من عشب الزعتر
للاستخدام مع المراهقين من عمر ١٢ عامًا والبالغين

احرص على قراءة تعليمات الاستخدام بالكامل بعناية، نظراً لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

يمكن الحصول على هذا الدواء بدون وصفة الطبيب. إلا أنه يجب استخدام برونشيبيريت تي بي وفقاً للتعليمات من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة للعلاج.

يرجى الاحتفاظ بتعليمات الاستخدام، فربما تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى فيما بعد.

أسأل الصيدلي إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات أو إذا كنت تحتاج إلى أي استشارات.

يرجى إخطار طبيبك أو الصيدلي إذا أحق بك أحد الآثار الجانبية المذكورة أضراراً جسيمة أو إذا لاحظت ظهور أي آثار جانبية غير واردة في تعليمات الاستخدام هذه.

تحتوي تعليمات الاستخدام على ما يلي:

- 1- التعريف بدواء برونشيبيريت تي بي ودواعى استعماله
- 2- الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل تناول برونشيبيريت تي بي
- 3- طريقة تناول برونشيبيريت تي بي
- 4- الآثار الجانبية المحتملة
- 5- طريقة تخزين برونشيبيريت تي بي
- 6- معلومات إضافية

1. التعريف بدواء برونشيبيريت تي بي ودواعى استعماله

برونشيبيريت تي بي هو دواء عشبي لنزلات البرد في الجهاز التنفسي. ويستخدم لتحسين أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد المصحوب بسعال ونزلات برد مع مخاط لزج.

2. الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل تناول برونشيبيريت تي بي

يحظر تناول برونشيبيريت تي بي:

إذا كانت لديك حساسية مفرطة للمواد الفعالة أو للشوفيات الأخرى (فضيلة النباتات الشفوية) أو للبتولة أو الشيح الشائع أو الكرفس أو لأحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في القسم 6.

الإرشادات التحذيرية والاحتياطات:

يرجى أن تتحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل أن تتناول برونشيبيريت تي بي. في حالة الأعراض التي تستمر لأكثر من أسبوعين أو في حالة حدوث ضيق في التنفس أو حمى أو وجود بلغم صديدي أو دموي، ينبغي زيارة الطبيب على الفور. ينبغي توخي الحذر في المرضى الذين يعانون من التهاب الغشاء المخاطي للمعدة أو من قرحة في المعدة.

الأطفال:

ينبغي عدم استخدام برونشيبيريت تي بي مع الأطفال الأقل من 12 عامًا. لا توجد دراسات كافية بشأن استخدام هذا الدواء مع الأطفال الأقل من 12 عامًا.

تناول برونشيبيريت تي بي بالتزامن مع أدوية أخرى:

يرجى إخطار طبيبك أو الصيدلي في حالة تناولك/استخدامك لأدوية أخرى سواء في الوقت الحالي أو منذ فترة قصيرة أو إذا كنت تنوي تناول استخدام أدوية أخرى.

لا توجد حتى الآن تفاعلات معروفة مع أدوية أخرى. لا توجد دراسات حول التفاعلات المحتملة عند تناول برونشيبيريت تي بي بالتزامن مع تناول أدوية أخرى

الحمل والرضاعة والخصوبة/الإنجاب:

إذا كنت حاملاً أو ترضعين أو إذا كنت تعتقدين أنكِ حاملاً أو تتوين الحمل، عليكِ استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

ينبغي عدم استخدام برونشيبيريت تي بي خلال فترتي الحمل والرضاعة بسبب عدم توفر دراسات كافية. لا توجد أي بيانات حول تأثير الدواء على الخصوبة/الإنجاب في البشر. في دراسات أجريت على الحيوانات لم يلاحظ وجود أي آثار على الخصوبة/الإنجاب.

قيادة السيارة والقدرة على تشغيل الآلات:

لا يلزم اتخاذ أي احتياطات خاصة.

برونشيبيريت تي بي يحتوي على الجلوكوز واللاكتوز.

يرجى عدم تناول برونشيبيريت تي بي إلا بعد التشاور مع طبيبك، إذا كنت تعرف أنك تعاني من عدم تحمل بعض أنواع السكر.

3. طريقة تناول برونشيبيريت تي بي

يجب تناول برونشيبيريت تي بي دائماً بدقة وفقاً للإرشادات الواردة في تعليمات الاستخدام هذه. يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا تمامًا من طريقة الاستخدام

يتم استخدام الجرعة المعتادة التالية، ما لم يصف الطبيب ما يخالف ذلك:
المراهقين من عمر 12 عامًا والبالغين يأخذون قرصًا مغلفًا واحدًا ثلاث مرات يوميًا.

طريقة الاستخدام:

يؤخذ برونشيبيريت تي بي دون مضغ مع تناول كمية كافية من السوائل (يُفضل مع كوب ماء).

مدة الاستخدام:

تتحدد مدة الاستخدام على حسب مسار المرض. في حالة الأعراض التي تستمر لأكثر من أسبوعين، ينبغي زيارة الطبيب على الفور.

تناول كمية أكبر مما ينبغي من برونشيبيريت تي بي:

في حالة تناول جرعة زائدة يمكن أن تحدث الأم في المعدة وقيء وربما إسهال. وفي هذه الحالة، يرجى إبلاغ الطبيب، حيث يمكنه تحديد الإجراءات اللازمة.

نسيان تناول برونشيبيريت تي بي:

لا تتناول كمية مضاعفة في الجرعة التالية إذا نسيت تناول الجرعة السابقة.

وقف تناول برونشبيريت تي بي:

إن وقف تناول برونشبيريت تي بي هو أمر آمن وغير مضر بوجه عام. إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى حول استخدام الدواء، عليك بسؤال طبيبك أو الصيدلي.

4. الآثار الجانبية المحتملة

على غرار كافة الأدوية قد يتسبب هذا الدواء أيضًا في ظهور آثار جانبية، إلا أنه ليس من الضروري أن تظهر هذه الآثار الجانبية على كل شخص. يتم الاعتماد على التصنيفات التالية كأساس لمعدلات تكرار حدوث الآثار الجانبية:

شائعة جدًا:

أكثر من شخص من كل 10 أشخاص معالجين

شائعة:

شخص واحد إلى 10 أشخاص من كل 100 شخص معالج

عارضة:

شخص واحد إلى 10 أشخاص من كل 1000 شخص معالج

نادرة:

شخص واحد إلى 10 أشخاص من كل 10000 شخص معالج

نادرة جدًا:

أقل من شخص من كل 10000 شخص معالج

غير معروفة:

لا يمكن تقدير معدل التكرار بناءً على البيانات المتاحة

الآثار الجانبية الخطيرة أو العلامات التي يجب عليها الانتباه إليها، والإجراءات اللازمة عند إصابتك بأي من هذه الأعراض الجانبية:

إذا حدث لك أي أثر من الآثار الجانبية التالية، عليك ألا تستمر في تناول برونشبيريت تي بي وأن تزور الطبيب في أسرع وقت ممكن، حيث يمكنه تحديد درجة الخطورة واتخاذ أي إجراءات إضافية ضرورية.

يمكن في بعض الأحيان أن تحدث أعراض معدية معوية مثل الغثيان والتقيء والإسهال.

يمكن في حالات نادرة جدًا أن تحدث تفاعلات فرط حساسية (تفاعلات حساسية)، على سبيل المثال ضيق في التنفس وطفح جلدي وأرتيكاريا وتورم في الوجه والقم و/أو البلعوم. في حالة ظهور أولى علامات تفاعلات فرط الحساسية يجب عدم تناول برونشبيريت تي بي مرة أخرى.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا لاحظت ظهور أي آثار جانبية، عليك الاتصال بطبيبك أو إلى الصيدلي. وينطبق ذلك أيضًا على الآثار الجانبية غير المذكورة في هذه النشرة الداخلية. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة إلى المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية، قسم التيقظ الدوائي، الكائن في 3 شارع كورت جورج كيسينجر ألي، 53175 بون، الموقع الإلكتروني: www.bfarm.de. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. طريقة تخزين برونشبيريت تي بي

يحفظ الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال. يحظر تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة المطوية أو العبوة (شريط الدواء). يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر.

شروط التخزين:

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد على 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

محتويات برونشبيريت تي بي:

المواد الفعالة:

كل قرص مغلف من برونشبيريت تي بي يحتوي على:

60 مجم خلاصة جافة من جذور زهرة الربيع (6:1) (حجم / حجم).

المكونات المستخلصة: إيثانول 47.4 % (حجم/حجم)،

160 مجم خلاصة جافة من عشب الزعتر (6:1) المكونات

المستخلصة: إيثانول 70 % (حجم/حجم).

المكونات الأخرى هي:

مركب كلوروفيلين أ – نحاس، ملح الصوديوم الثلاثي (E141)،

كروسوفيدون، ثنائي الميثيكون، شراب جلوكوز، ثنائي أكسيد السليكون عالي التشتت،

هيدروكسي بروبيل ميثيل سيللوز، مونوهيدرات اللاكتوز، ستيرات المغنيسيوم، مايكروكريستالين

سيلولوز، نكهة النعناع الغلفلي، تشتت البولي أكريلات 30%.

بوفيدون K25، بروبيلين جليكول، ريبوفلافين (E 101)، سكارين

الصوديوم، طلق، ثاني أكسيد التيتانيوم (E 171).

ملحوظة لمرضى السكر:

يحتوي القرص الواحد من برونشبيريت تي بي في المتوسط على 0.02 وحدة خبز قابلة للحساب.

برونشبيريت تي بي خالٍ من الجلوتين

شكل ومحتويات عبوة برونشبيريت تي بي:

عبوات تحتوي على 20 (N1) قرص مغلف، 1 شريط يحتوي

على 20 قرص مغلف عبوات تحتوي على 50 (N2) قرص

مغلف، 2 شريط يحتوي كل منها على 25 قرص مغلف عبوات

تحتوي على 100 (N3) قرص مغلف، 4 شرائط يحتوي كل منها

على 25 قرص مغلف برونشبيريت تي بي هي أقراص مغلفة

خضراء مستديرة محدبة الوجهين وذات سطح نصف مطفاً للتمعن

شركة الأدوية والشركة المنتجة:

BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt

الهاتف: 90-231/ 09181

التليفاكس 09181 / 231-265

الموقع الإلكتروني: www.bionorica.de

البريد الإلكتروني: info@bionorica.de

التوزيع المشترك:

PLANTAMED Arzneimittel GmbH
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt

الهاتف: 0-231/09181

التليفاكس: 21850 / 09181

مت آخر مراجعة لتعليمات الاستخدام هذه في سبتمبر/أيلول 2014.

