

Инструкция по медицинскому применению: информация для потребителя



Бронхипрет® Сироп ТЕ

Жидкость для приема внутрь

Действующие вещества:
тимьяна травы экстракт жидкий
плюща листьев экстракт жидкий
Для взрослых и детей старше 1 года.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению, поскольку в ней представлена важная информация.

Данный лекарственный препарат можно приобрести без рецепта врача. Для достижения наиболее эффективного результата лечения соблюдайте рекомендации по применению препарата Бронхипрет Сироп ТЕ.

- Сохраните данную инструкцию по медицинскому применению препарата для дальнейшего использования. Возможно, Вам понадобится повторно ознакомиться с представленной в ней информацией.
- Для получения дополнительной информации или рекомендаций обратитесь к фармацевту.
- Если какое-либо из указанных побочных действий значительно ухудшило Ваше состояние, или Вы обнаружили побочные действия, не указанные в данной инструкции, сообщите об этом врачу или фармацевту.

В данной инструкции по медицинскому применению препарата содержится следующая информация:

- Что такое Бронхипрет Сироп ТЕ и для чего применяется данный препарат?
- На что необходимо обратить внимание до начала приема Бронхипрет Сироп ТЕ?
- Как принимать Бронхипрет Сироп ТЕ?
- Какие побочные действия может иметь данный препарат?
- Как хранить Бронхипрет Сироп ТЕ?
- Дополнительная информация

1. ЧТО ТАКОЕ БРОНХИПРЕТ СИРОП ТЕ И ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ?

Лекарственный препарат растительного происхождения для лечения простудных заболеваний дыхательных путей. Для лечения острого бронхита, сопровождающегося кашлем, и простудных заболеваний с образованием вязкой мокроты.

2. НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ДО НАЧАЛА ПРИЕМА БРОНХИПРЕТ СИРОП ТЕ?

Бронхипрет Сироп ТЕ запрещается принимать при повышенной чувствительности к плющу, растениям семейства Аралиевых, тимьяну или другим губоцветным (Lamiaceen), березе, полыни, сельдерее или какому-либо из вспомогательных веществ препарата, указанных в разделе 6.

Препарат Бронхипрет Сироп ТЕ необходимо принимать с особой осторожностью:

Если симптомы заболевания сохраняются дольше одной недели, при повышении температуры, затрудненном дыхании, а также при выделении гнойной или кровянистой мокроты следует незамедлительно обратиться к врачу.

Дети:

Препарат Бронхипрет Сироп ТЕ противопоказан к применению детьми младше 1 года.

При приеме препарата Бронхипрет Сироп ТЕ совместно с другими медикаментами:

Проинформируйте своего врача или фармацевта, если Вы принимаете/применяете или недавно принимали/применяли другие лекарственные препараты, даже если это медикаменты, отпускаемые без рецепта врача.

При приеме препарата Бронхипрет Сироп ТЕ одновременно с продуктами питания и напитками:

Данные отсутствуют.

Беременность и грудное вскармливание:

Перед началом приема любых лекарственных препаратов проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Запрещается принимать препарат Бронхипрет Сироп ТЕ во время беременности и грудного вскармливания, поскольку такой опыт применения недостаточно исследован.

Способность управления транспортными средствами и механизмами: Дополнительные меры предосторожности не требуются.

Важная информация о некоторых вспомогательных веществах препарата Бронхипрет Сироп ТЕ:

Данное лекарственное средство содержит 7 % об. этанола.

В состав данного лекарственного препарата входит раствор мальтитола. Если Вы страдаете непереносимостью отдельных видов глюкозы, то перед началом приема препарата Бронхипрет Сироп ТЕ следует проконсультироваться с врачом.

3. КАК ПРИНИМАТЬ БРОНХИПРЕТ СИРОП ТЕ?

При приеме препарата Бронхипрет Сироп ТЕ всегда строго следуйте указаниям, представленным в данной инструкции по медицинскому применению. В случае возникновения сомнений проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом. Если врачом не предписан иной режим приема, то используется следующая стандартная дозировка:

Возраст	Разовая доза в мл (3 x ежедневно)	Общая суточная доза
Дети от 1 года до 5 лет	3,2 мл	9,6 мл
Дети от 6 до 11 лет	4,3 мл	12,9 мл
Взрослые и дети старше 12 лет	5,4 мл	16,2 мл

Способ применения:

Используйте для дозирования прилагаемый мерный стаканчик и принимайте Бронхипрет Сироп ТЕ 3 раза в день (утром, днем и вечером) неразбавленным или разбавленным в небольшом количестве воды. При необходимости сироп можно запить жидкостью (не содержащей алкоголя), предпочтительно стаканом воды. Препарат Бронхипрет Сироп ТЕ можно принимать во время еды, с напитками или независимо от приемов пищи. При проблемах с желудком рекомендуется принимать Бронхипрет Сироп ТЕ после приема пищи.

Перед применением встряхнуть!

Длительность курса:

Длительность курса лечения зависит от течения болезни. Если симптомы сохраняются дольше одной недели, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Если Вы приняли слишком большую дозу препарата Бронхипрет Сироп ТЕ:

При передозировке возможны боли в области желудка, рвота и диарея. В этом случае проконсультируйтесь с врачом. При необходимости врач назначит подходящее лечение.

Если Вы забыли принять очередную дозу препарата Бронхипрет Сироп ТЕ:

Если Вы приняли слишком маленькую дозу препарата Бронхипрет Сироп ТЕ или пропустили прием очередной дозы, то не следует удваивать дозу при следующем приеме препарата. Просто продолжайте принимать препарат в соответствии с предписаниями врача или рекомендациями инструкции по медицинскому применению.

Если Вы прерываете прием препарата Бронхипрет Сироп ТЕ:

Завершить прием препарата Бронхипрет Сироп ТЕ можно, как правило, в любой момент.

Если у Вас остались вопросы по применению лекарственного средства, задайте их своему врачу или фармацевту.

4. КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ?

Как и все лекарственные средства, препарат Бронхипрет Сироп ТЕ может вызвать побочные действия, которые, однако, проявляются не у всех пациентов.

При выявлении частоты развития побочных действий используются следующие категории:

Очень часто:

более 1 пациента из 10

Часто:

от 1 до 10 пациентов из 100

Иногда:

от 1 до 10 пациентов из 1 000

Редко:

от 1 до 10 пациентов из 10 000

Очень редко:

менее 1 пациента из 10 000

Нет данных:

Оценить частоту развития на основании доступных данных не представляется возможным

Серьезные побочные действия или признаки, на которые следует обратить внимание, и мероприятия при их обнаружении:

Если у пациента проявляется одно из представленных ниже побочных действий, необходимо прекратить прием препарата Бронхипрет Сироп ТЕ и незамедлительно обратиться к врачу. Врач оценит тяжесть состояния и примет решение относительно необходимости проведения дальнейших мероприятий.

Иногда возможны нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, например, спазмы, тошнота, рвота.

Редко возможны проявления повышенной чувствительности (аллергических реакций) с высыпаниями на кожных покровах. Также возможны проявления повышенной чувствительности, например, одышка, крапивница, отек лица, рта и/или глотки. При возникновении первых признаков реакции повышенной чувствительности следует прекратить прием препарата Бронхипрет Сироп ТЕ.

Информирование о побочных действиях

Если вы обнаружите у себя побочные действия, сообщите о них своему врачу или фармацевту. Это касается также побочных действий, не указанных в данном информационном листке. Помимо этого, Вы можете направить сообщение о побочном действии непосредственно в Отделение фармаконадзора Федерального института лекарственных средств и медицинских изделий (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz), Курт-Георг-Кизингер-Аллее 3, 53175 Бонн, Германия, интернет-сайт: <http://www.bfarm.de>. Сообщая о побочных действиях, Вы способствуете пополнению базы данных о безопасности данного лекарственного средства.

5. КАК ХРАНИТЬ БРОНХИПРЕТ СИРОП ТЕ?

Лекарственные средства следует хранить в недоступном для детей месте.

Запрещается использовать препарат после истечения срока годности, указанного на картонной упаковке или флаконе. Срок хранения распространяется на период до последнего дня месяца.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C. Лекарственные препараты следует хранить в оригинальной упаковке, чтобы защитить содержимое от воздействия света.

Длительность хранения после вскрытия:

После вскрытия хранить не более 6 месяцев.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из чего состоит Бронхипрет Сироп ТЕ:

Действующие вещества:

100 мл (соответствуют 112 г) сиропа для приема внутрь содержат: 16,8 г тимьяна травы экстракта жидкого (1 : 2-2,5); экстрагент: водный раствор аммиака 10% (м/м); глицерин 85% (м/м); этанол 90% об.: вода (1:20:70:109); 1,68 г плюща листьев настойка (1:1), экстрагент: этанол 70% об. Данное лекарственное средство содержит 7 % об. этанола.

Вспомогательные вещества:

кислоты лимонной моногидрат, вода очищенная, гидроксипропилбетадекс, калия сорбат, мальтитола раствор

Информация для больных сахарным диабетом:

Разовая доза препарата Бронхипрет Сироп ТЕ (5,4 мл) содержит в среднем 0,18 хлебной единицы (BE), подлежащей учету.

Внешний вид препарата Бронхипрет Сироп ТЕ и содержимое упаковки:

Бронхипрет Сироп ТЕ доступен во флаконах по 50 мл (N1) и 100 мл (N2). Препарат Бронхипрет Сироп ТЕ представляет собой прозрачную жидкость светло-коричневого цвета

Фармацевтическая компания и производитель:

БИОНОРИКА СЕ

Кершенштайнерштрассе 11-15

92318 Ноймаркт

Телефон: 09181 / 231-90

Факс: 09181 / 231-265

Интернет-сайт: www.bionorica.de

Электронная почта: info@bionorica.de

Совместный сбыт:

ПЛАНТАМЕД Арцнаймиттель ГмБХ

Кершенштайнерштрассе 11-15

92318 Ноймаркт

Телефон: 09181 / 231-0

Факс: 09181 / 21850

Последний раз изменения в данную инструкцию по медицинскому применению препарата вносились в декабре 2014 года.